



Regione Emilia-Romagna

ASSESSORATO ALLA SANITA'

KONTRACEPTIMI



CONOSCERE PER SCEGLIERE



CONOSCERE PER SCEGLIERE

 **Regione Emilia-Romagna**

ASSESSORATO ALLA SANITA'

Entet e perfshira ne projekt

Spazio donne immigrate Forlì
Spazio donne immigrate Rimini
Consulterio donne immigrate e loro bambini Bologna
Centro salute donne straniere Modena
Spazio donne immigrate Ravenna
Centro per la salute della famiglia straniera Reggio Emilia
Spazio donne immigrate Parma
Spazio donne immigrate Sassuolo

Redaksia

Maria Dirce Vezzani, Centro salute donne straniere Modena
me bashkepunimin e Sivana Borsari, Assessorato alla sanità Regione Emilia-Romagna
Damiana Di Biaggio, Spazio donne immigrate Rimini
Paola Ferretti, Centro per la salute della famiglia straniera Reggio Emilia
Michela Giuliani, Spazio donne immigrate Ravenna
Margherita Ricci, Spazio donne immigrate Forlì
Angela Venturini, Centro per la salute della famiglia straniera Reggio Emilia
Franca Vignoli, Spazio donne immigrate Sassuolo

Bashkepunimi botues

Marta Fin, Assessorato alla sanità Regione Emilia Romagna
Maurizia Gherardi, Azienda Sanitaria USL Modena

Projekti grafik dhe faqosja

Avenida - Modena

Perkthimi

Studio Ascì - Crema

Shtypshkronja

Grafiche Jolly

“Te njohesh per te zgjedhur”. Titulli i ketij botimi sjell ndermend nje nder detyrat kryesore te punonjesve te Sherbimit shendetesor krahinor: te ndertojne marrredhenie korrekte dhe te respektueshme me personat qe atyre u drejtohen. Ne fakt, eshte themelore qe Sherbimi yne shendetesor t'u garantoje te gjithë personave te pranishem ne Emilia-Romagna sherbime shendetesore te pershtatshme per ruajtjen, kurimin dhe kthimin e shendetit. Por eshte po aq e rendesishme qe personat qe jetojne ne krahinen tone te kene mjetet njohese te nevojshme per te bere zgjedhje te vetedijshme per sa i perket shendetit te tyre dhe sherbimeve qe u propozohen. Per kete eshte e nevojshme qe punonjesit dhe punonjaset shendetesore te dine te japin informacione e spjegime, te dine te degjojne e te keshillojne.

Ne kete rast u drejtohem, ne veçanti, grave te huaja qe jetojne ne krahinen tone per t'u dhene informacionet e duhura per te zgjedhur, nese deshirojne, metoden e tyre kontrceptive. Duam ne kete menyre te japim nje kontribut ne menyre qe shtatezania te jete nje moment i lumtur, dhe qe, me ane te perdorimit te sakte te kontrceptimit, te jete gjithnje me i ulet numri i grave qe nderpresin vullnetarisht shtatezanine, nje zgjedhje qe e dime se eshte gjithsesi e dhimbshme dhe e veshtire.

Kjo broshure jep informacionet e para. Per te sqaruar dyshime, probleme, per te marre ndikime konkrete, grate dhe çiftet mund tu drejtohen Konsultoreve familiare te pranishem ne çdo ane te krahines tone, dhe Hapesirave per grate imigrante dhe femijet e tyre. Do te gjejne sherbime dhe njerez te gatshem per ti degjuar.

Giovanni Bissoni
Assessore alla sanità
Regione Emilia-Romagna



PERSE SHERBEN KONTRACEPTIMI

Seksualiteti është perberesi natyror e jetesor i secilit prej nesh. Është e rëndësishme për të gjithë të jetojnë një seksualitet që shpërblen dhe jep kenaqësi, që lejon një shkëmbim ndjenjash dhe dashurie, që bazohet në respektin reciprok. Seksualiteti, përveç faktit se i shërben mbijetesës së racës njerëzore, me një fjalë riprodhimit, është edhe një mënyrë e veçantë dhe intime për të hyrë në marrëdhënie me një person tjetër. Pikerisht sepse seksualiteti shpreh një nevojë ndjesore jetesore, ka momente ose periudha të jetës në të cilat dëshirohet të jetohet plotësisht për vlerën e tij të shkëmbimit ndërmjet personave, dhe jo për nderlikimet riprodhuese. Për këtë duhet të njihen metodat kontraktive, në mënyrë që të zgjidhet lirisht parasegjithash nëse ti përdorim, dhe me pas cilat ndër ta të përdorim si me të përshtatshmet për nevojat tona personale.

Me fjalën "kontraktim" kuptojmë mundësinë për të evituar që pas raportit seksual të kemi një shtetëzani. Në këtë mënyrë ai bëhet një mjet për të lidhur ngjytjen me barrë me mundësinë për ta pritur femijën me dashuri pas lindjes së tij. Një grua ose një çift mund të kenë shumë arsye për të mos dashur një shtetëzani. Radhisim disa nga këto arsye, duke treguar histori grash të huaja, të ardhura në Emilia-Romagna.

Gifti, Olena, Fatima, gjinden në Itali nga pak kohë. Nder ta, dikush mendon të rrijë për pak kohë, të tjerat dëshirojnë të rrinë me gjatë.

Belen, Asuncion, Joyce kanë ardhur në Itali me përgjegjësinë e gjithë familjes, për të gjetur një punë dhe për të mbledhur paratë që shërbejnë për të ndihmuar njëzërit që kanë lënë në shtëpi. Pasi të kenë mbledhur shumën që duhet, disa dëshirojnë të kthehen në shtëpi, të tjerat nuk janë të martuara e mendojnë të martohen mbas kthimit.

Aicha, Kira, Valdetre, Iman kanë ndjekur burrat, dhe , sapo ardhur në Itali, kanë kuptuar se sa e vështirë mund të jete jeta në emigrim.

Kanë kuptuar se familja e tyre në vend të huaj nuk mund t'i vare shpresat në shumë femije, ose të pakten që është e nevojshme të presin ndërmjet një lindjeje e tjetres. Nuk kanë të afërmit që t'i ndihmojnë në punët e lodhshme shtëpiake dhe në edukimin e femijeve, jeta në vend të huaj nganjehere është shumë e ndryshme nga ajo që kalohet në familjeri. Shkollë, megjithatë është një ndihmë, kërkon gjithësesi kohë e punë për një nënë.

Valbona, Edoukou, Melika, Luan kanë ardhur në Itali sepse dëshironin të gjenin një rrugëzgjidhje për të ardhmen e tyre. Këtu gratë, të pakten sipas të thenave, duhet të kenë me shumë mundësi e të jenë me të lira. Por kërkimi i një rruge për të ardhmen, duke qenë vetëm, mund të jete i lodhshëm e mund të thote të mos të kesh menjehere mundësinë për t'u bërë nënë.

Te gjitha keta gra me histori e projekte jete shume te ndryshme mes tyre kane te perbashket nevojen per te vendosur kur te kene nje femije e kur te mund te evitojne shtatezanine, te pakten ne nje periudhe te caktuar te jetes se tyre. Perdorimi i nje metode kontraceptimi lejon te kesh marredhenie seksuale te qeta dhe vetedijeshme, pa frike shtatezanish te papritura.





SI TE ZGJEDHIM METODEN KONTRACEPTIVE

Metodat kontraceutive te ilustruara ne kete broshure jane te gjitha te prapesueshme, me nje fjale nese nderpritet perdorimi, humbet efekti kontraceutiv. Per te zgjedhur metoden e vet kontraceutive, cdo grua duhet te kete informacione mbi kontraceutivet qe ekzistojne, mbi rregullat korrekte te perdorimit te secilit, mbi rreziqet e mundshme per shendetin dhe efektshmerine per te parandaluar shtatezanine. Informacionet duhet te jepen nga punonjesh shendetesore te pregatitur: kujdes "keshillat e keqija", shpesh te afermit ose miqte mund te japin informacione te peraferta ose te pasakta. Mamite e Keshilltori familiar jane persona te pregatitur per te ndihmuar gruan dhe çiftin ne zgjedhjen e menyres kontraceutive me te pershtatshme. Efektshmeria e nje menyre kontraceutive shprehet ne zotesine per te parandaluar shtatezanine. Vleresimi i saj duhet te kete parasysh edhe gabimet e mundshme gjate perdorimit ose perdorimin me nderpritje.

Zgjedhja behet nga gruaja ose nga çifti ne bashkepunim per personelin shendetesor (mamija ose gjinekologu), ne baze te nevojave te veta.

Grate e vetme, nenat qe kane lindur nga pak kohe, grate me shume femije, grate qe nderrojne shpesh partner, ose grate shume te reja, kane nevoja kontraceutive te ndryshme e specifike.

Menyra e jo-prapesueshme, domethene sterilizimi kirurgjik mashkullor ose femeror qe sjell pamundesine perfundimtare per te pasur femije, perdoret vetem ne rastet qe kunderkeshillojne nje shtatezani te metejshme e vetem me autorizimin e qarte te se interesuares ose te se interesuarit. Sterilizimi duhet te jete nje vendim i peshuar mire nga secili perberes i çiftit, i marre mbas nje bisede te thelluar me nje ekspert (psh te Konsultorit).

ZGJEDHJA E KONTRACEPTIVIT ESHTË NJË RAST PËR TË VLËRESUAR GJENDJEN E SHËNETIT DHE TË JETËS SEKSUALE DHE NDJENJESORE

Momenti i zgjedhjes kontraceutive, dhe i takimit me mamine ose gjinekologun/en e Konsultorit Familiar (ose me mjekun e familjes), mund te paraqese edhe rastin per te vleresuar gjendjen shendetesore te organeve seksuale. Mund te diskutohet mundesia e disa kontrolleve te nevojshme (vizita gjinekologjike, senollogjike e Pap test) per t'u bere me tej.


Ne keto biseda mund te sqarohen liresisht dyshime ose probleme te lidhura me seksualitetin si femeror ashtu edhe mashkullor. Me fjale te tjera, se bashku me operatorët shendetesore, duke respektuar plotesisht jeten private te secilit, mund te flitet per probleme si mungesa e deshires seksuale, derdhja e parakohshme e fares, vesh tiresia e eksitimit dhe/ose mungesa e orgazmes.

SI JEMI NDERTUAR

FIZIOLOGJIA E APARATIT GJINOR FEMEROR

Organet riprodhuese femerore jane ilustruar ne figuren 1

Ardhja e te permuajshmes se pare shenon fillimin e prodhimit te vezeve ne vezore. Çdo e permuajshme ndiqet nga tre faza. E para quhet faze prevezore (nga dita 6-12): ne vezore veza piqet dhe ne miter cipa mukoze (endometri) trashet. E dyta quhet faze vezimi (nga dita 12 - 15): ne vezore veza nxirret jashte dhe nepermjet tubit te mitres arrin ne zgavren mitrore; ketu mund te pllenohet nese gruaja ka nje raport seksual me derdhje te spermes ne vaggjine. E treta quhet faze pasvezore (nga dita 16- 28): ne vezore qelizat e folicolit shnderrohen te trup luteo i destinuar per prodhimin e progjesteronit, hormoni qe siguron mbajtjen e shtatezanise ne fazat e para. Ne miter mukoza e mitres (endometri) eshte gati per te pritur vezen e pjelluar; nese kjo nuk ndodh endometri eliminohet me fluksin e te permuajshmes (faze e te permuajshmes qe zgjat 3-5 dite).




figuren 1

Kohezgjatja e fazave te ciklit te te permuajshmes mund te ndryshoje shume nga gruaja ne grua, por edhe e njejta grua mund te kete cikle me kohezgjatje te ndryshme. Per te llogaritur ciklin e te permuajshmes eshte e keshillueshme te shenohet ne nje kalendar dita e fillimit te çdo te permuajshmeje.

FIZIOLOGJIA E APARATIT GJINOR MASHKULLOR

Organet riprodhuese jane ilustruar ne figuren 2

Kur mashkulli arrin moshen e pjekurise seksuale, testikulat e tij fillojne te prodhojne spermatozoide dhe vazhdojne ta bejne per tere jeten. Gjate raportit seksual, mashkulli derdh spermatozoidet e pranishem ne sperme, ne vagjinen e gruas. Zakonisht nje spermatozoid mund te jetoje nga 24 deri ne 120 ore.



figuren 2

● Metoda Ogino-Knauss (e kalendarit ose numerimit te diteve)

Eshte nje medote statistike dhe bazohet mbi dallimin e diteve pjellore duke llogaritur kohezgjatjen e 12 cikleve te te permuajshmeve te meparshme, te rregjistruar nga gruaja ne kalendar.

● Metoda e mukusit qafor (Billings)

Konsiston ne vrojtimin e perditshem te pamjes e te trashesise se mukusit vagjinor, dhe te vleresimit te pershtypjeve subjektive qe gruaja ka ne nivelin e organeve gjinore te jashtme. Mbi keto vleresime dallohen ditet pjellore.

● Metoda sintotermike

Kjo menyre bashkon rregjistrimin e temperatures trupore me vrojtimin e karakteristikeve te mukusit vagjinor dhe shenja te tjera qe shoqerojne vezimin, si ndryshimet e qafes se mitres dhe tensioni i gjendrave te gjiut.

● Menyra e dallimit te periudhes pjellore me kompjuter

Behet nepermes nje kompjuteri te vogel qe eshte ne gjendje te mbaje ne kujtese informacione mbi karakteristikat e te permuajshmeve personale dhe te mase ne urinen e mengjesit te dhenat e dy hormoneve nepermes shiritave shenues. Mund te perdoret vetem nga gra qe kane cikle qe zgjasin nga 25/35 dite.

DOBITE

Keto metoda nuk kerkojne vizita mjeksore kontrolli ose perdorimin e substancave mjekesore. Pranohen nga shume besime fetare. Rrisin mundesine per te njohur funksionimin e trupit dhe besimin mes burrit e gras.

TE METAT

Bazohen mbi marreveshjen e partnereve per te shmangur raportet vagjinore ne periudhen pjellore, per disa çifte nevoja per t'u ruajtur nga raportet vagjinore gjate periudhes pjellore shkakton stres. Gjithashtu duhet marre parasysh qe mund te kete raste (prania e infeksioneve, perdorimi i lavazheve vagjinore, perdorimi i gjel-it, ose spermicideve vagjinore) qe ndryshojne temperaturen trupore, ose karakteristikat e mukusit vagjinor, e per rrjedhoje nuk bejne te sigurt interpretimin e te dhenave.

KOSTOJA

Nuk kushtojne asgje, me perjashtim te metodes se dallimit te periudhes pjellore me kompjuter ose te termometrit per te matur temperaturen baze.





BASHKIMI SEKSUAL I NDERPRERE

ÇFARE ESHTË

Bashkimi seksual i ndeprere njihet si nje nder metodat kontraceptive natyrore meqenese nuk parashikon perdorim substancash ose mbrojtetish, por bazohet ne nje veprim te mashkullit. Per te perdorur me efektshmeri bashkimin seksual te nderprere, mashkulli duhet te mesohet te njohe momentin e nevojshem per te hequr penisin nga vagjina, menjehere para derdhjes se fares. Nese raporti do te perseritet, eshte e nevojshme qe burri te urinoje e te laje organet gjinore para se te rifilloje raportin. Kjo metode konsiderohet pak e sigurt, meqenese nder 100 çifte qe e perdorin per nje vit mund te kemi 19 shtatezani.

Shume faktore bejne qe kjo metode te jete pak e sigurt: spermatozoidet mun te jene te pranishem ne lengun e nxjerre para hedhjes se fares; jo gjithmone mashkulli e ndjen kur duhet momentin qe i paraprin kenaqesise maksimale dhe derdhjes se fares.

DOBITE

Perdorim i menjehershem, nuk kushton, non sjell rreziqe per shendetin fizik.

TE METAT

Pak efektshmeri ne parandalimin e shtatezanise. Nuk mbron nga semundjet ngjitese seksuale.



HAPI - PILULA

ÇFARE ESHTË

Eshtë emri i dhene kontrceptimit nepermes gojes. Me e perdorura formohet nga perberja (pilula e perbere) e dy hormoneve femerore: esterogjene e progesterone. Parandalon shtatezanine duke bllokuar vezimin e duke ndryshuar rolin e mukusit te mitres dhe te tubes.


Eshte shume e efektshme per te parandaluar shtatezanine, mbasi nder 100 gra qe e perdorin ne nje vit pa gabime vetem 0.5 % mund te kene nje shtatezani. Duke pasur parasysht gabimet me te zakonshme 3 gra nder 100 mund te kene nje shtatezani. Pervec rolit kontrceptiv, pilula perdoret me sukses per shume patologji femerore. Kerkon saktesi gjate perdorimit, prandaj eshte mire qe gruaja te marre masa per te mos harruar ta pije.

SI VEPROHET

Pilula duhet te jipet nga mjeku (i Keshilltorit familjar ose mjeku i familjes), qe shqyrton historine klinike, ben nje vizite mjeksore, ben pap test dhe ne qofte nevoja analizat e gjakut. Sidoqofte keshillohen kontrole periodike çdo vit.

Mbas nje abortimi, nese nuk ka kunderkeshillime, mund te mirret qe nga dita e operacionit.

Ne 6 muajt e pare mbas lindjes, nese gruaja ushqen femijen me gjiun e vet, eshte e preferueshme te perdoret nje lloj i veçante pilule, qe quhet edhe "minipilula", qe nuk nderhyn me sasine e qumeshtit te prodhuar.



DOBITE

Pilula eshte shume e efektshme, nese mirret me rregull. Pasojat jane te prapesueshme, me nje fjale nderpritin ne çastin ne te cilin nuk mirret me.

Kryen role te dobishme: rregullon te permuajshmet dhe pakeson dhimbjet, pakeson fluksin e te permuajshmeve duke parandaluar anemine, kuron aknen.

TE METAT

Ka nevoje per kontrole mjekesore (ne Keshilltorin familjar ose tek mjeku i familjes) para dhe gjate marrjes. Jo te gjitha grate kane kushtet fizike per ta marre (psh. kunderkeshillohet ne grate me tension te larte, semundjet tromboembolike dhe ne grate qe pijne shume duhan). Nuk mbron nga semundjet qe transmetohen seksualisht (si psh. SIDA, hepatitet, gonorreja), per te cilat eshte i domosdoshem perdorimi i prezervativit. Rrallehere mund te sjelle shqetesime qe mund te kerkojne nderpritjen e saj: shtim peshe, dhimbje e fryrje te vazhdueshme te kembeve, dhimbje koke, depresion, ndryshim te deshires seksuale. Problemet e medha jane shume te rrada dhe zakonisht jane te lidhura me çrregullimet e mpirjes se gjakut (trombo-hembolite).

KOSTOJA

Çmimi i çdo pakete ndryshon sipas llojit, vetem disa lloje jane pjeserisht te pagueshme nga Sherbimi shendetesor kombetar. Ne kosto duhet perfshire kontrolli fillestar i mjekut dhe analizat e mundshme.



KONDOMI (PREZERVATIVI OSE PARAMBROJTESI)

ÇFARE ESHTË

Kondomi , zakonisht i quajtur prezervativ ose parambrojtës, është një cipe shumë e hollë gome elastike që duhet të shkohet mbi penis. Mbledh spermën dhe ndalon derdhjen në vagjinë.

Kondomi, nëse përdoret siç duhet, e me një fjalë nëse hiqet vetëm pas mbarimit të plotë të raportit seksual, shmang shtatezaninë: në një vit përdorimi nga 6 deri në 12 gra ndër 100 kanë mbetur shtatzene, mbrojtja rritet nëse përdoret me spermicide (krem, shkumë, film, vezeza).

Kondomi bën që raporti të jetë i sigurt edhe kundër infeksioneve që transmetohen seksualisht sepse bllokon shkëmbimin e lëngjeve biologjike që mund të jenë të infektuar, por duhet të përdoret për çdo raport e për gjithë kohezgjatjen e tij. Mbron që të dy partnerët gjatë raporteve vagjinore, gojore dhe anale.

Siguron një mbrojtje të mirë për infeksionet në vazhdim: Vagjinite nga tricomonas, Infeksione të organeve gjinore të mbrendshme femerore (i quajtur PID), Gonorreja, Klamidya, Sifiliti, SIDA. Për infeksione të tjera (kondilomia, Herpes gjeneral, hepatit B) mbrojtja është me pak e efektshme.

Kondomi mbron nga infeksionet e transmetueshme seksualisht. Asnjë kontraceptiv tjetër nuk jep këtë mbrojtje, por ka kontraceptive me të efektshëm për të parandaluar shtatezaninë.

SI VEPROHET

Nuk është e nevojshme të jipet ose të kontrollohet nga mjeku. Kondomi blihet në farmaci, tek duhanshitesi, në supermerkatë ose në shpërndaesit automatikë. Edhe spermacidet shiten lirshëm në farmaci.

Duhet të përdoret me shumë delikatësi. Paketa nuk duhet mbajtur afër burimeve të të nxehtë (as siper kruskotit të makines ose në portafol). Para përdorimit, duhet verifikuar data e skadimit. Është me mirë të përdoren prezervative të lubrifikuar; kur nuk janë të tilla, lyhet me një lubrifikant brenda e jashtë në mënyrë që të parandalohet çarja. Lubrifikantet duhet të jenë me perberje me baze uji (gjel), sepse ata me baze vajrash (krem, vazeline, burro fresko o vaj) mund të ndihmojnë çarjen.

DOBITE

Nuk paraqet rreziqe për shëndetin, nuk kërkon nderhyrje nga ana e mjekut, është i lehtë për t'u përdorur. I lejon mashkullit të marrë pjesë me efektshmeri në kontracëptim. Është një zgjidhje e vlershme në mes të metodave të tjera, edhe për çiftet e qëndrueshme, për shëmbull gjatë ushqimit me gjil të fëmijës.

TE METAT

Në rast difektësh të prodhimit ose të përdorimit të gabuar, ekziston rreziku që prezervativi të griset ose të zhvishet gjatë raportit seksual. Gjithashtu, partnerët mund të gjinden ngushtë e ta shohin si pengesë fizike ndërmes tyre. Për të shmangur një gjë të tillë është me mirë të provohet disa here, pa ngut, mbi penis, para se të fillohet raporti.

KOSTOJA

Kostoja ndryshon sipas llojit dhe vendit ku blihet.





KONTRACEPTIMI I JASHTEZAKONSHEM

ÇFARE ESHTË

Kontracetimi i jashtezakonshe, qe parandalon shtatezane pas nje raporti te pambrojtur ose "te rrezikshem", quhet edhe kontracetimi i dites prapa. Mund te kryhet ne dy menyra: nepermes marrjes se hormoneve ose te vendosjes se spirales. Nese gruaja eshte shtatzene, kontracetimi i jashtezakonshe nuk shkakton abortimin e femijes.

SI VEPROHET

Pas nje raporti "te rrezikshem", nese ka frike te mbetet me barre, gruaja duhet te vihet ne kontakt menjehere me Konsultorin familjar, ose me mjekun e familjes, ose me ndihmen e shpejte gjinekologjike. Mjeket do te japin te gjitha informacionet e duhura mbi llojin e kontracetimit te jashtezakonshe me te keshillueshe. Mund te kerkohet:

- ne rast se prezervativi eshte çare dhe derdhja e fares ka ndodhur ne vagjine
 - nese partneri nuk ka arritur te derdhe faren jashte vagjines
 - nese eshte perdorur metoda e shmangjes se perkohshme dhe gruaja i ka bere gabim llogarite e "diteve jo-pjellore"
 - ne rast se gruaja ka harruar te marre pilulen kontracetive
 - ne rast se çifti nuk ka perdorur asnje metode kontracetimi.
-

DOBITE

Kontracetimi i jashtezakonshe ul deri ne 75% mundesine qe ne rrjedhim te nje raporti "te rrezikshem" te kemi shtatezani.

TE METAT

Nuk mbron nga semundjet e transmetueshme seksualisht. Nuk eshte i efektshem per te parandaluar shtatezane nese gruaja ka pasur raporte te tjera te pambrojtura gjate muajit.

KOSTOJA

Perputhet me ate mujore te "pilules" ose te spirales.



KONTRACEPTIMI INJEKTUES Injektimi periodik

ÇFARE ESHTË

Eshtë një injeksion brendamuskulor, njemujor ose tremujor, e një substançe që quhet Medrossiprogesterone në gjendje të prodhojë një kontracetim që zgjat në kohe dhe shumë të efektshëm. Injektimi tremujor parandalon shtatezanine për tre muaj, injeksioni njemujor e parandalon për një muaj.

Nder 100 gra që e përdorin në një vit vetëm 3 mbeten shtatzene.

SI VEPROHET

Jipet nga gjinekologu mbasi ka shqyrtuar historinë klinike të gruas, duke kryer vizita të hollësishe e nëse është nevoja duke bërë edhe analizat. Injektioni bëhet në krah ose në vithe çdo 4 ose 12 javë, sipas dozave që përdoren.

DOBITE

Eshtë një zgjedhje që i përket vetëm gruas, askush nuk mund ta kuptojë nëse përdor këto metode.

Nuk nderhyn në aktivitetin seksual.

Mund të përdoret gjatë ushqimit me gjii të femijes (duke filluar 6 javë pas lindjes).

Uj dhimjet e të përmuajshmeve dhe anemine; mbron nga kanceri i vezores dhe endometrit.

TE METAT

Duhet bërë një injeksion çdo muaj ose tre muaj.

Pasojat e kësaj metode nuk janë për prapësueshme menjehere: Eshtë e mundur që pas nderpritjes, të mos arrihet të mbetet me barre për shumë muaj.

Pasojat rrjedhese si parregullsia e të përmuajshmeve ose pershtypja e fryrjes mund të vazhdojnë për disa muaj pas nderprerjes.

KOSTOJA

Çdo doze ilaçi ka kosto të ulët, por duhet llogaritur edhe kostoja e kontrollit mjekësor në fillim dhe nevoja për të bërë injeksionet.





SPIRALJA

ÇFARE ESHTË

Eshtë një objekt i vogël plastike elastike me forma të ndryshme, me gjatësi 3-4 centimetra, pak milimetra i trashë që, i futur në zgavren mitrore, parandalon shtatzëzimin me shumë efektshmëri.

Në një vit ndër 100 gra që përdorin këto metode, vetëm një të mbetet shtatzënë.

Ka dy lloje spiralesh që veprojnë me mekanizime shumë pak të ndryshme mes tyre për të arritur të njëjtin rezultat: spermatozoidet ngadalesohen ose bëhen të padëmshëm, mukusi që vesh mitren merr karakteristika të papërshtatshme për të pritur shtatzëzimin. Një tip spiraleje lëshon jonë bakri e argjendi për të arritur efektin kontraktiv, i dyti lëshon një hormon të ngjashëm me progjesteronin (levonorgestrel).

SI VEPROHET

Spiralja duhet të jipet nga mjeku dhe të vendoset nga gjinekologu (psh nga gjinekologu i Konsultorit), pas një vizite të kujdeshme mjeksore.

Spiralja ka kohë të gjatë veprimi: nga 3 deri në 5 vjet, sipas llojit, kështu shpenzimi fillestar i blerjes justifikohet me shumë vjet përdorimi.

DOBITE

Kur vendoset, nuk është e nevojshme të shtohen masa të tjera kontraktive, por, është mirë të kujtojmë se duhet gjithsesi një kontroll gjinekologjik periodik (zakonisht një herë në vit).

Spiralja vepron vetëm mbi aparatën gjinore dhe jo mbi tërë trupin. Spiralja që lëshon hormone (levonorgestrel) ul intensitetin e fluksit të tërë permuajshmes.

TE METAT

Spiralet që lëshojë jonë bakri mundën, nganjëherë, të zgjasin kohezgjatjen e fluksit të tërë permuajshmes dhe të shtojnë intensitetin; gjithashtu mund të shtojnë dhimbjet e tërë permuajshmes.

Në grata e reja pa femije, ose në ata që ndërrojnë shpesh partner, spiralja mund të shtojë shpeshtësinë dhe rëndesën e infeksioneve të thella, domethënë të infeksioneve në mitër dhe vezore.

Spiralja nuk mbron nga shtatzëzimi jashtë mitres dhe nga rrjedhjat e saj. Nuk mund të veteadministrrohet nga gruaja: duhet gjinekologu për ta dhënë e vendosur, ka nevojë për kontrollë gjinekologjike periodike.

KOSTOJA

Kostoja fillestare e paketës është relativisht e madhe. Duke marrë parasysh kohezgjatjen e përdorimit (3-5 vjet) dhe efektshmërinë e lartë, mund të konsiderohet një metode me kosto të ulët.





CONOSCERE PER SCEGLIERE